



AGROGLOBAL

TOPRAĞA GÜÇ KATIYORUZ

* KATI KİMYEVİ GÜBRELER



15.15.15

İçeriğinde azot, fosfor ve potasyumu aynı oranda bulunduran kompoze bir gübredir. Kullanılan bitkide, meyve ve tanelerin kalitesini artırır. Olması gerekenden az miktarda potasyum bulunan topraklarda ve potasyuma gereksinim duyan bitkilerde kullanılır. Turunçgiller, meyve, sebze, antep fıstığı, pamuk ve ayçiçeği yetiştiriciliğinde tercih edilen bir gübre çeşitidir. Diğer bitkilerde de rahatlıkla kullanılır. Tahıl grubunda güçlü bir sap yapısı oluşturarak yatmaları önler. Taban gübresi olarak ekim/dikimle birlikte ya da öncesinde, tohum veya kök seviyesindeki derinliğe uygulanmalıdır.

15.15.15+Zn

Azot, fosfor ve potasyumu aynı oranda içeren ve %1 çinko katkılı bir taban gübresidir. Çinko yoksunluğu olan topraklarda uygulanır. Bitki, büyüme aşamasında çinkoya ihtiyaç duyar. 15-15-15+Zn, bitkinin her dönemine ait ihtiyaç duyduğu besin maddelerini içermekle beraber sağlıklı gelişimin devam etmesini de çinko ile sağlar. Tahılların yanı sıra meyve, sebze ve çilek gibi ürünlerde de kullanılır. Ekimden hemen önce veya ekim sırasında kullanılır. Tohum veya kök seviyesindeki derinliğe uygulanmalıdır.

DAP

Fosfor eksikliği olan toprakların ürün miktarı ve kalitesinde düşüşler meydana gelebilir. DAP, çokça fosfor içerdiği için bitkinin ilk gelişme aşamasında kök gelişim hızını artırır ve kök yapısını kuvvetlendirir. Çiçeklenmeyi sağlayarak tane ve meyve oluşumunu artırır. Ekim / dikim esnasında ya da öncesinde, tohum veya kök seviyesindeki derinliğe uygulanmalıdır. İlkbaharda ekilecek bitkilerde, ekimden hemen önce ve genellikle toprağın 10 - 15 cm derinliğine uygulanması tavsiye edilir.

20.20.0

Türkiye'de kullanımı en yaygın olan taban gübresidir. İçeriğinde azot ve fosforu aynı oranda bulundurur. Ayçiçeği, hububat, pamuk ve mısır öncelikli olmak üzere bütün bitkilerde ekim esnasında taban gübresi olarak kullanılır. Bitkilerin kök, gövde oluşumuna etki eder. Gübre, toprak üzerine bırakılmamalıdır, bitki kök veya tohum derinliğine gömülerek uygulanmalıdır.

20.20.0+Zn

Gübre, yapısında azot ve fosforla beraber ek olarak %1 çinko da içerir. Azot ve fosforla beraber çinkonun bitkilerin büyümesinde önemli etkisi vardır. Çinko eksikliğinde bitkiler kısılar. Çinko, bitkinin kış soğuklarına karşı dayanıklılığını artırır. Meyvelerin olgunlaşmadan dökülmesini engeller ve kalitesini artırır. Mibzerle ekim yapılırken bant şeklinde, tohum veya bitki kök seviyesi derinliğine uygulanır. Tarla ürünleri öncelikli olmak üzere tüm bitkilerde kullanılır.

AMONYUM SÜLFAT

Amonyum formunda bir azot kaynağıdır. Diğer azotlu gübrelerden farkı, bitkiler için önemli elementlerinden biri olan kükürdü %24 oranında içermesidir. Bu özelliğinden dolayı ekim zamanında taban gübresi gibi de kullanılabilir. Azot ve kükürt elementlerinin noksan olduğu topraklar için kıymetli bir besin kaynağıdır. Bolca su bulunan veya yağış alan arazilerde nitrat içeren azotlu gübrelerde kayıplar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlar nedeniyle nitratlı gübrelerin yerine amonyum sülfat, her türlü toprakta kullanılabilir. Çeltik tarımında yaygın şekilde kullanılır.

ÜRE

Kimyevi gübreler içerisinde daha çok azot içeren bir gübredir. Üre, yeterli şekilde verildiğinde çiçeklenmeye etki ettiği gibi kök ve gövde gelişimine de katkı sağlar. Yeşil kısımların oluşumunu teşvik ederek bitkinin güneşten yararlanmasını sağlar. Böylelikle bitkide verim artışı oluşur. Üre, eksik verildiğinde bitki gelişimi yavaşlar, tane ve meyve verimi de düşer. Üre, tohum ve köklere yakın uygulanmamalıdır. Sonbaharda ekim zamanında, ilkbaharda ise üst gübre olarak uygulanabilmektedir.

GRANÜL ÜRE

Üre, granül formda olduğundan dolayı çokça yağış alan ve azot noksanlığı olan topraklar için tavsiye edilir. Erimesi yavaş olduğu için bitki uzun süre azottan faydalanabilir. Bitki gövdesi ve kökünün gelişimine direkt olarak etki eder. Yapısından dolayı mibzerle ve elle serpiildiğinde eşit oranda dağılım sağlanır. Tohum ve köklere yakın uygulanmamalıdır. Sonbaharda ekim zamanında, ilkbaharda ise üst gübre olarak uygulanabilmektedir.

CAN

Yapısında amonyum ve nitrat azotlarını içerir. Nitrat azotu, bitkilerin süratli olgunlaşma döneminde ve ürüne yatma dönemlerinde kökler tarafında süratlice alınır. Amonyum formundaki azotun çokça bir bölümü ise toprak parçacıkları tarafından tutulur, daha sonra azot bakterileri tarafından nitrat azotuna çevirilir ve bu şekilde bitkiler azot noksanlığı çekmez. CAN gübresi, arpa ve buğday gibi tahıllar ve fındık başta olmak üzere bütün bitkilerde üst gübre olarak uygulanır. Çeltik tarımında ise kullanılmamalıdır.